Pinella bianca

Vass6R07s186-190




FINA Collection Vassal-Montpellier

1268Mtp2

Pinella bianca 5.11510

blone, sperique mozen


















Année : 1987 Emplacement... 5. 11. \$.10.... Désignation. Pinella brança ! Nombre ! ! Total !------! d'yeux ! 24,3 ! DATES D le 24.3,87

٧4

ANNEE 1989 NOM Binella bianca EMPLACEMENT 5-11 S10 126802 GRZ 3186.190											
Souche	Nbre yeux		rement mi/déb	Nbra	Ferti- lité	Flo	raisor		Vé	raison	Maturité
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		Pourri	133 x ture :		Port:	mi'an	Ye Vi	gueur	fail	le	

NOM Pinella Cianca EMPLACEMENT 5 M S 10 × 1268. Hali 6R7 4186.130												
Souche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor	Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin		Maturité	
1 2 3 4 5 5		133	16.3×	0	Pour : Baie : Couleu	TG - disc-s r : B- : s -	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	- P -ov-o Rg-N ar - f	Dim: bov-cy: <u>Jus</u> ox - he	l-fus : inc erb		: L - M- C

Désignation :

44

Pinella Cianca

Emplacement :

5. 11 S10 A.S

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 1 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé de cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) en gouttière 8- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 84

Année 2005

4

Observateur: 8L

Code cépage: 1268-2 Code clo Nom cépage: Pinella branca

Code clone:

Emplacement: 6 R7 \$ 186_180

5.11810

Bourgeonnement

oiv 001 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte7.

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente 1 en liseré 2 - partout 3.

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 005 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4 premières feuilles) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3-cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.

oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 3 - forte 7 - très forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières)

Profil: étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201.

Densité poils couchés face inf.: nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204.

Densité poils dressés face sup.: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup.: blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan 1 en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218

très forte 219.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

Désignation : Emplacement : Pinella Cianea. 5.11 \$10 gas an chepitie

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

4

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.
 - (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.

 entièrement 8 partiellement 9.
 - (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

(floraison)

Année : 2005

4

Code cépage :

Code clone Nom cépage : Pinella branca

Observateur: S/

nlimboolimboolimboolimbool

Emplacement: 6 R71 186, 190 5 = fordes 5-11 8 10 1 tie fail

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé 1 - demi-érigé 3)- horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.
oiv 009 couleur face dorsale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.
oiv 010 couleur face ventrale noeuds: verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3. oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3

Couleur non

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1)- présence 9.

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 1 présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1- moyenne 5 - forte 9.

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds : nulle ou très faible 1)- moyenne 5 - forte 9.

oiv 015 pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 015* pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - moyenne 2

- forte ou très forte 3

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 ou moins) 1- subcontinue ou continue (3 ou plus) 2. oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 + moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9

<u>Inflorescence</u>

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3) femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1° inflorescence : jusqu'au 4° noeud 1- au-delà du 4° noeud 2

oiv 153 nombre inflorescence/rameau: 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée (2.)

Villosité spéciale du rameau herbacé: aucune 288 et 289 - épines ou analogues 243 - poils massifs 244.

Couleur des vrilles : verte 260 - jaune 261 - rouge 262 et 263

4

No ordre

Dasignation VASSAL Planche côté nº FEUILLE ADULTE 34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3. Vace supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre — séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 52 velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 ? <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 62 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes : plan en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6. 37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - Long 1 - moyen (2) - court 3. 39 - glabre ()- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8. 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - trtalement 8. 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2)- autre 3. - angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3) - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

-Calvo 83

Formulaire de description 6/8

Sarment

(après chute des feuilles)

Année: 1899

4

Code cépage: 1268

Code clone: 02

Nom cépage : Pinella branca

Observateur

Emplacement: 5.11510 6 R7 s 186_190 Josever

oiv 101 section transversale : circulaire 1)- elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1)- côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1)- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 1)- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence T)- présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3- moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5)- grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 / faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens(2) - saillants 3.

prime 3 viguen 3

N° d'ordre: 1268.02 Désignation: Puiella bianca Emplacement: 6 R 7 S 186.190

4

: 1 -(2) - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - (8) - 9 L1/L : 10 - 11 , : 12 - 13 - 14 - 15 - 16 L2/L Nombre de lobes : 17 - (18) - (19) - (20) Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : 25 - 26 - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : 267 Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : 31 - (32) - 33 - 34 - (35) - (36) - 37 - 38 - 39 Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : 271 Sinus latéral Supérieur ouvert : 40 - (41) Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59 Nbre dents du point pét. à L3 : 60 - 61 - 62 Angle des nervures L3 L'3 : (63) - (64) - (65) - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92